

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

DLP 20-6-70 075227

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION DE LA RÉGION PARISIENNE

PARIS, HAUTS DE SEINE, SEINE-SE-DENIS, VAL DE MARNE, ESSONNE, VAL D'OISE, YVELINES, SEINE ET MARNE,

ABONNEMENT ANNUEL
25 F

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux, 47 Av. Paul-Doumer, (93) MONTREUIL-S-BOIS - 287 76-71
C. C. P. PARIS 9063-96

BULLETIN N° 117
Supplément n° 2

19 JUIN 1970

AVERTISSEMENTS

MILDIOU DE LA POMME DE TERRE

GRANDES CULTURES

Les dernières pluies d'orage survenues depuis le 16 ont créé localement des conditions favorables aux contaminations; de durée et d'intensité très variables, elles ont été souvent suivies de brouillard ou de brume permettant d'entretenir une humidité pendant des durées de l'ordre de 20 heures. Dans les secteurs où de telles conditions se sont produites, une sortie de taches est à craindre pour le début de la semaine du 22 au 27 juin. La protection des plantes doit donc être correctement assurée.

Dans les cultures où un traitement a été effectué récemment, tenir compte de l'importance de la pluviométrie et du développement rapide de la végétation pour son renouvellement.

Dans les rares secteurs où la sécheresse persiste, le traitement pourra être reporté après une prochaine période pluvieuse; il peut être également différé dans les zones de culture extensive.

CONCOURS MILDIOU : le concours reste ouvert.

- DORYPHORE : les foyers, d'importance souvent réduite, sont néanmoins assez nombreux; profiter du traitement fongicide pour intervenir.

TAVELURES DU POIRIER ET DU POMMIER

CULTURES FRUITIÈRES

La situation reste inchangée quant à la possibilité de contaminations par ascospores. Les dernières pluies n'ont été à l'origine de contaminations que localement (feuillage mouillé pendant 15 à 20 heures); la sortie de taches correspondante devrait se produire en fin de mois.

CARPOCAPSE DES POMMES ET DES POIRES

Les émergences arrivent à leur fin dans la plupart des secteurs. Des éclosions larvaires importantes sont à craindre au moins jusqu'à fin juin début juillet.

INFORMATIONS

DIVERS

- CARPOCAPSE DES PRUNES : situation semblable à celle du C. des Pommes.
- ACARIENS DES ARBRES FRUITIERS : plus de 75 % des œufs d'été sont actuellement éclos.
- ANTHRACNOSE DU CERISIER : intervenir sur les variétés sensibles avec, Doguadine (90 g.), Phaltane (100 g.), Manèbe (160 g.), Oxyquinoléate de cuivre (50 g.), ma;Hl. Attendre éventuellement la fin de la récolte.
- TEIGNE DU POIREAU - MOUCHE DU CHOU : les sorties d'adultes sont plus importantes.
- PUCERONS SUR CULTURES MARAÎCHÈRES : foyers localement importants.
- MOUCHE DE LA CERISE : un deuxième traitement doit être appliqué dix à douze jours après le premier.

L'Ingénieur et l'Agent technique
chargés des Avertissements Agricoles,

H. SIMON et R. MERLING.

L'Inspecteur
de la Protection des Végétaux,

R. SARRAZIN.

Dernière note : Bulletin 117 - Supplément 1 - 12 juin 1970.

7233

Imprimerie de la Station de la Région Parisienne - Directeur-Gérant : L. BOUYX.
47, Av. Paul Doumer - 93 - MONTREUIL-SOUS-BOIS.